

ANIMATE No.8

CONTENTS

| | | |
|---|---|----|
| New record of Hardwicke's forest bat, <i>Kerivoula hardwickii</i> (Horsfield, 1824) (Chiroptera, Vespertilionidae, Kerivoulinae) from Taiwan | Mizuko YOSHIYUKI, Liang-Kong LIN, Takashi MIZUSAWA, and Nobuhito HONDA | 1 |
| Light sensitivity of Japanese moles (<i>Mogera imaizumii</i> and <i>Mogera wogura</i>)* | Emi ITO, Motokazu ANDO, and Kimiyuki TSUCHIYA | 11 |
| New locality of the Japanese dormouse at Iida, Nagano Pref., Japan* | Kunihiro MITSUISHI | 16 |
| American mink (<i>Mustela vison</i>) and Japanese weasel (<i>Mustela itatsi</i>) on the banks of Kohata River, Fukushima Prefecture* | Yoshiyuki KIMURA, Tomoaki KATO, Sayaka MATSUMURA, Megumi KOIBUCHI, and Migiwa MORITA | 19 |
| The Shinjuku Gyoen National Garden as a habitat of the raccoon dog* | Isao YOSHINO | 33 |
| Formation of the ventral fins in the medaka <i>Oryzias latipes</i> * | Takashi IWAMATSU | 37 |
| Cautiousness of wild medium-small mammals to human* | Motokazu ANDO | 42 |
| Notes on the collected dsinezumi shrew, <i>Crocidura dsinezumi</i> from Sado Island, Niigata Prefecture, Japan* | Haruo SATO and Mizuko YOSHIYUKI | 49 |
| Nesting tree selection by the Grey-faced Buzzard (<i>Buteastur indicus</i>)* | Mineo OOTA | 51 |
| Notes on some fishes attacking for bird in Japan* | Masao OHNO | 53 |

(*… in Japanese)

March 2010

Zoological Society of Tokyo University of Agriculture

ANIMATE 第8号

目 次

| | | |
|--|----------------------------|------------|
| 台湾から新記録のウーリーコウモリ (英文) | 吉行瑞子・林 良恭・水澤 孝・本多宣仁 | 1 |
| 日本産モグラ類2種、アズマモグラおよびコウベモグラにおける光の感受性に関する研究 | 伊藤絵美・安藤元一・土屋公幸 | 11 |
| 長野県におけるヤマネの新産地 | 三石邦廣 | 16 |
| 福島県木幡川周辺のアメリカミンクとイタチ | 木村吉幸・加藤智明・松村沙綾香・鯉渕 恵・森田みぎわ | 19 |
| 新宿御苑におけるタヌキの生息環境 | 吉野 熱 | 33 |
| メダカの腹鰓形成 | 岩松鷹司 | 37 |
| 野生中小哺乳類の警戒心と人慣れ | 安藤元一 | 42 |
| 佐渡島から得られたニホンジネズミについて | 佐藤春雄・吉行瑞子 | 49 |
| 所変われば木も変わる—サシバの営巣木選定 | 太田峰夫 | 51 |
| 鳥を捕らえる魚類の覚え書 | 大野正男 | 53 |
| ANIMATE投稿の決まり (56) | 農大動物研究会会則 (表紙3) | 編集後記 (表紙3) |

2010年3月

農大動物研究会